



REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO**

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO,
VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 300 13 00

F: 01 300 13 56

E: gp.uvhvvr@gov.si

www.uvhvvr.gov.si

Številka: U34330-17/2014/22

Datum: 17. 2. 2017

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ljubljana, Dunajska c. 22, izdaja na vlogo **Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjska ul. 6, Ljubljana**, v zadevi izdaje dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin na podlagi 5. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12; ZFFS-1; v nadaljnjem besedilu: ZFFS-1) in 7. člena Uredbe o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/2015), naslednje

DOVOLJENJE ZA NUJNE PRIMERE V ZVEZI Z VARSTVOM RASTLIN

1. **Dovolita se promet ter omejena in nadzorovana uporaba** fitofarmacevtskega sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS) **ADMIRAL 10 EC** (*piriproksifen* 100 g/L), ki ga proizvaja Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., ki ga zastopa Arytisa LifeScience Great Britain Ltd., 3-5 Melville Street, Edinburgh, United Kingdom, EH3 7PE, ter v Republiki Sloveniji distribuira Hmezad Exim d.o.o., Vrečerjeva 14, Žalec (v nadaljnjem besedilu: distributer).
2. UPORABA: FFS ADMIRAL 10 EC je insekticid z dolgim rezistentnim ovicidnim in larvicidnim načinom delovanja, ki zavira razvoj začetnih faz žuželk. Uporablja se:
 - za omejevanje številčnosti populacije **ameriškega kaparja** (*Diaspidiotus* (*Quadraspidiotus*) *perniciosus*) **na pečkarijih (jablanah in hruškah)** v odmerku 40 mL/hL vode v fenološki fazi pred cvetenjem jablan in hrušk (BBCH 07-09), pri izhodiščni porabi vode 800 L/ha, oziroma v največjem dovoljenem odmerku 0,32 L/ha;
 - za omejevanje številčnosti populacije **murvovega kaparja** (*Pseudaulacaspis pentagona*) **na koščičarijih (breskve, marelice in nektarine)** v odmerku 35 do 40 mL/hL vode v fenološki fazi pred cvetenjem breskev, marelic in nektarin, ko so konice zelenih listov 5 mm nad brstnimi luskami (BBCH 09) oziroma v razvojnem stadiju oplojenih samic, pri izhodiščni porabi vode 800 L/ha, oziroma v največjem dovoljenem odmerku 0,32 L/ha.

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi. Vsa tretiranja morajo biti izvedena pred cvetenjem tretiranih rastlin. Natančen čas uporabe sredstva napove opazovalno napovedovalna služba za varstvo rastlin.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili.

KARENCA: Karenca za jabolane, hruške, breskve, nektarine in marelice je zagotovljena s časom uporabe.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov *piriproksifen* so določene s predpisi o mejnih

vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

OZNAČEVANJE: Imetnik dovoljenja je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji tega dovoljenja. Imetnik dovoljenja mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

OPOZORILA: Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk oprasovalcev se ne tretira med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti oziroma se cvetočo podrast odstrani. Potrebno je preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

VARNOST PRI DELU: Pri pripravi in uporabi sredstva je treba nositi zaščitno obleko, očala/ščitnik za obraz, pokrivalo s širokimi kraji, nepremočljive rokavice in trpežno obutev.

DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo na njej popolnoma posuši.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. V primeru nezavesti se ga namesti v položaj za nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se izvaja oživljanje po standardnem ABC postopku: sprostitve dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo.

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.

Stik s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z veliko vode in milom. Če je potrebno se posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je treba kontaminirano obleko oprati.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre vekci prizadetega očesa in oko temeljito izpere s čisto vodo. Odstraniti je treba kontaktne leče. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže embalažo, etiketo ali varnostni list. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar.

Napotki za zdravnika: Ne izpira se želodca, razen če tako svetuje Center za zastrupitve. Aktivno oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično. Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije.

3. FFS ADMIRAL 10 EC smejo v Republiki Sloveniji uporabljati pri MKGP registrirani pridelovalci jabolk, hrušk, marelic, breskev in nektarin, ki imajo nasade napadene z škodljivimi organizmi, navedenimi v 2. točki tega izreka, in ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

5. KOLIČINA FFS: do 200 L.

6. MESTO IN NAČIN PRODAJE: FFS se lahko prodaja neposredno preko distributerja samo znanim kupcem iz 4. točke tega izreka. FFS ne sme biti v prosti prodaji. FFS se proda samo na zahtevo pridelovalcev iz 4. točke tega izreka. Distributer navedenega

FFS vodi evidenco kupcev (ime, natančen naslov, številko potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine), podatek o datumu nakupa ter količini FFS, prodani posamičnemu kupcu. EMBALAŽA: Dajanje sredstva v promet je dovoljeno za namene, določene v tem dovoljenju, v originalni embalaži.

ETIKETA: FFS mora biti opremljeno z etiketo z navodilom za uporabo, ki je v prilogi in je sestavni del tega dovoljenja.

7. Distributer navedenega FFS lahko evidenco iz prejšnje točke tega izreka uporabi zgolj in samo za namen poročanja Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
8. Distributer navedenega FFS mora ob prodaji navedenega FFS vsakega kupca pisno seznaniti z vsemi pogoji uporabe, ki so navedeni v izreku tega dovoljenja.
9. Registrirani pridelovalci iz 4. točke tega izreka, ki bodo uporabili FFS ADMIRAL 10 EC, morajo o uporabi zgoraj navedenega FFS voditi posebno evidenco, v kateri navedejo: lokacijo in površino nasada, datum uporabe FFS, dejansko uporabljeno količino FFS, dejansko količino uporabljene vode, vrsto tretirane rastline, morebitna opazanja v zvezi z uporabo FFS ter opazanja v zvezi s pojavom ameriškega oziroma murvovega kaparja v tretiranih nasadih. Uporabniki FFS morajo evidenco poslati distributerju najpozneje **v roku 30 dni** po izteku veljavnosti tega dovoljenja.
10. Najpozneje **v roku 60 dni** po izteku veljavnosti tega dovoljenja mora distributer Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poslati skupno poročilo o prometu in uporabi FFS, ki vsebuje podatke iz evidence o prodaji in uporabi, ki so navedeni v 6. in 9. točki tega izreka.
11. Dovoljenje za nujne primere za uporabo v intenzivnih nasadih jablan, hrušk, marelic, breskev in nektarin pridelovalcev iz 4. točke tega izreka se izda za 120 dni in **velja od 17. 2. 2017 do 17. 6. 2017.**

O b r a z l o ž i t e v

Vlagatelj Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ul. 6, Ljubljana, je dne 27. 1. 2017 vložil vlogo št. U34330-17/2014/21 za izdajo dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za uporabo FFS ADMIRAL 10 EC (*piriproksifen* 100 g/L), ki ga proizvaja Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., ki ga zastopa Arytisa LifeScience Great Britain Ltd., 3-5 Melville Street, Edinburgh, United Kingdom, EH3 7PE, ter v Republiki Sloveniji distribuira Hmezad Exim d.o.o., Vrečerjeva 14, Žalec. Vlagatelj je vlogi priložil strokovno utemeljitev, da je v letu 2017 ponovno nujna uporaba navedenega sredstva za zatiranje ameriškega kaparja (*Diaspidiotus (Quadraspidotus) perniciosus*) in murvovega kaparja (*Pseudaulacaspis pentagona*) v nasadih jablan, hrušk, breskev, marelic in nektarin. Gospodarska škoda v preteklih letih je bila zaradi obsega napada navedenih škodljivcev v nekaterih nasadih zelo velika, za ta namen pa ni v Republiki Sloveniji registrirano nobeno FFS.

Pristojni organ je pregledal predloženo in na EU nivoju dostopno dokumentacijo. Predložena dokumentacija je v skladu s predpisi, zato je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na podlagi 53. člena Uredbe 1107/2009/ES in 7. člena Uredbe o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmaceutvskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/2015) zaradi nepredvidljive nevarnosti, ki jo predstavljata ameriški in murvov kapar, izdala dovoljenje za nujne primere za uporabo FFS ADMIRAL 10 EC pod pogoji, kot je razvidno iz izreka tega dovoljenja.

STROŠKI: Stroški postopka izdaje dovoljenja za nujne primere v skladu s V. točko priloge 2 Uredbe o izvajanju Uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/2015) v višini 700,00 EUR so plačani.

Taksa po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5, 32/16) v vrednosti 22,60 EUR je plačana.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to dovoljenje je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v 15 dneh od vročitve tega dovoljenja. Pritožba se vloži pri organu, ki je izdal dovoljenje, na naslov: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana, in sicer pisno ali ustno na zapisnik ali pa priporočeno po pošti. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v višini 18,10 EUR po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5, 32/16), na TRR: 0110-1000315637, sklic 11 23370-7111002.

Postopek vodila:


Tatjana Bučar
podsekretarka





dr. Janez Posedi
generálni direktor

Poslano:

1. ZUP - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ul. 6, 1000 Ljubljana;
2. RI - Hmezad Exim d.o.o., Vrečerjeva 14, 3310 Žalec;
3. elektronsko - gp-ursk.mz@gov.si (Urad RS za kemikalije);
4. arhiv, tu.

Priloga - etiketa FFS ADMIRAL 10 EC:

ADMIRAL® 10 EC



Vsebuje: pripravljeno 100 g/L (10 % w/w)
CAS št.: 95737-68-1

Vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vdihu v dihalno pot je lahko smrtno. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati prahu/dimov/plina/meglie/hlapov/razpršila. Nositi zaščitne okoliščine za oči/zgornjo in spodnjo ustno votlino. Nositi zaščitno obleko. Zaščitno za obliki koncentrata za emulzijo (EC).
Nadaljevanje z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZAŠTUPITVE ali zdravilnika. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odrinite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez poškodbe oči. Nadaljevanje z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZAŠTUPITVE ali zdravilnika. NE iztovarjajte hrane. Ob požaru: Za glasnega uporabljati pesek, suhe kemikalije ali peno, odprano na alkohol. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mlačno vodo. Da bi preprečili vnetja za ljudi in okolje, ravnavajte v skladu z navodili za uporabo.

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Napor za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje preko ureznin in odprtih ran na kmetijskih zemljiščih in cestah.

INSEKTICID

INSEKTICID - sredstvo za zatiranje rastlinskih škodljivcev formulirano v obliki koncentrata za emulzijo (EC)


Datum postopka rešila uporabe:
2 leti od datuma proizvodnje.

Kontrolna številka formulacije in datum proizvodnje:
Odbanjena na embalaži.

Proizvajalec: Sumitomo Chemical
Agro Europe S.A.S.



SUMITOMO CHEMICAL
Distributer: Hmezad s.p. s.d.,
Vreščevy 14, 3310 Zalec,
TEL: 03/713-49-14, www.hmezad.si



Kontaktne informacije:
Arysta LifeScience
3-5 Melville Street, Edinburgh,
United Kingdom, EH3 7PE

* Zaščitna znanja



Priloge skrajšanja:

Sredstvo shranjujemo v suhem, dobro zračenem prostoru, v originalno zaprti embalaži, pri sobni temperaturi, ločeno od hrane, pijače in krmil ter nedostopno otrokom.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Pripravek je namenjen izključno za tržne pridelovalce!

Sredstvo se lahko prodaja samo neposredno preko distributerja in ob predložitvi potrdila o znanju iz fitomedicine!

Ponovna uporaba prazne embalaže ni dovoljena!

Način delovanja:

Za Admiral 10 EC je značilno dolgo resistentno insekticidno delovanje z ovidnim in larvicidnim načinom delovanja. Aktivna snov pripravljene s svojim juvenilnim hormonskim delovanjem zavira razvoj enolitec (Hemolipera) v zakereni fazi razvoja. Juvenilni hormon je snov, ki jo žuželka v naravi proizvaja sama, in je nujno potreben za popolni razvoj žuželke. S tretiranjem v priporočenem času razvoja škodljivcev vplivamo na neravnovesje fizioloških procesov razvoja organizmov. Vpliv pripravka glede na razvojni stadij škodljivca:

1. **škratježarica:** Admiral 10 EC povzroči inhibicijo embriogeneze, kar prepreči razvoj embrija v že odloženem jajčku.
2. **zrca študij larve:** v tem stadiju pripravek povzroči močno poruševanje ravnovesja hormonov in posledično s tem, povzroči nemormalno število larvalnih stadijev, kateri se v nadaljnjem razvoju normalno razvijajo.
3. **zdravilni larvalni stadij:** **zaxsax:** v tej fazi razvoja lahko povzroči že dodane vmesne razvojne oblike med larvo in imago, ki pa ne vodijo v razvoj odraslega oseba.
4. **odrasla žuželka:** tretiranje v tej fazi nima nobenega direktnega vpliva na delovanje škodljivca.

Uporaba: ADMIRAL 10 EC je insekticid z dolgim rezistentnim ovidnim in larvicidnim načinom delovanja, ki zavira razvoj začernih faz žuželk. Uporablja se:

- **na kvadratnih listih (abnanih in hruckah) za omejevanje številčnosti populacije ameriškega kaparja (Quadraspidiotus perniciosus)** v odmerku 40 ml/ha, vode v fenološki fazi pred cvetenjem, jablan in hrušk (BBCH 07-09), pri izhodni porabi vode 800 L/ha, oziroma v največjem dovoljenem odmerku 0,32 L/ha.
- **na kosovinskih breskve, marelice in nektarine** za omejevanje številčnosti populacije **muravoske kaparja (Pseudaulacaspis pentagona)** v odmerku 35-40 ml/ha vode v fenološki fazi pred cvetenjem, ko so konice zelenih listov 5 mm nad testnimi lukami (BBCH 09) oziroma v razvojnem stadiju popolnih samič, pri izhodni porabi vode 800 L/ha oziroma največjem dovoljenem odmerku 0,32 L/ha.

OPAZORILA:

S sredstvom se sme na istem zemljišču tretirati največ enkrat v eni rastni dobi. Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opravelecev ne tretiramo med cvetenjem gojenih rastlin in podrazi oziroma se cvetočo podraz odstrani. Natančen čas uporabe sredstva napove opazovalno napovedovalna služba za varstvo rastlin.

Varovanje okolja:

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov, jaset in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise o področju varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v bližini 15 m širinske širine od meja brega voda 1. reda in 5 m od meja brega voda 2. reda.

Fitotoksičnost (obdelovalnost rastlin): Pripravek ne povzroča poškodb na gojenih rastlinah (ni fitotoksičen), če ga uporabljamo v skladu z navodili.

Mešanje (kompatibilnost): Pripravek se ne uporablja v mešanici z drugimi sredstvi.

Karenca: Karenca za jabolna, hruške, breskve, nektarine in marelice je zagotovljena s časom uporabe.

Nevarnost in varnostni ukrepi:

Admiral 10 EC draži kožo in v primeru zaužitja lahko povzroči poškodbo pljuč. Je seslo strupen za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Pri delu je potrebno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, ki veljajo za delo s pripravki za varstvo rastlin. Pri pripravi in uporabi sredstva je potrebno nositi zaščitno obleko, očiščilnik za obraz, pokrivalo s širokimi kraji, neprepeljivo rokavice in trapezno ubitve. Med delom ne smemo jesti, piti in kaditi. V primeru kontaminacije in/ali sumu na zastrupitev oreehamo z delom in ukrepano po navodilu prve pomoči. Po delu se temeljito umijemo in preoblačimo.

Delovna korenca: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo na njih popolnoma posuši.

Prva pomoč in medicinski ukrepi ob nevarnosti:

Solobni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak, ali v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. V primeru nezavesti se ga nenehno v položaj za nezavestnega (na levi loki) v primeru zastaja dihanja in/ali zastaja srca se izvaja reanimacija po standardnem ABC postopku: sprostitve dihalaht poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca. Pokličite se zdravilnika in se mu pokažite originalno embalažo in/ali navodila za uporabo.

Pri vdihavanju: Ravnanje se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.

Sliz s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, krta se temeljito umije z veliko vodo in milom. Če je potrebno se posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je potrebno kontaminirano obleko oprati.

Kontakt s očmi: S palcem in kazalcem se razpre vekci prizadete oseba in oko temeljito izpere s čisto vodo. Odstraniti je treba kontaktne leče. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravilnika in se mu pokaže embalažo, etiketo ali varnostni list. Ne iztva se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje ničesar piti.

Napiski za zdravilnika: Ne iztva se želodca, razen če tako svetuje center za zastrupitve. Aktivno oglje in salicilno obojalo se daje le, če tako svetuje center za zastrupitve. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično, zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije.

Priprava sredstva za uporabo:

Omerjeno količino sredstva vlijemo v rezervoar škropilnice napolnjen s polovico potrebne količine vode. Nato ob stalnem mešanju dolijemo vodo do potrebne količine.

Varnostni ukrepi v primeru nenamernega izliva v okolje:

V primeru nesreče pri presede takoj ugasnemo motor, vozilo, obvestimo center za obveščanje 112, zavarujeemo na požar in v pripravi na preprečevanje nadaljnje škode. Uporabimo primarno zaščitno opremo. Posrednim načinom nudimo prvo pomoč, ker pa ukrepano kot pri nevarnosti v zaprtem prostoru. Pri vsakih različnih odtiranjih tudi vrnijo plav zemljo. V zaprtim prostoru damo pesk, drovno embalažo. V izsteno označemo vsejo embalažo, po razlizen pripravo kurosemo, absorbirajočo sredstvo ter odpravimo v zabnik posebnih odpadkov pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu vrtnih odpadkov. Na občinah z vodo in detergentom. Vseje količine vode za izpiranje zberemo, da ne onesnažimo odprtih kanalov, potokov, jezov, tekočin in stojnih voda. V primeru požara gaismo s prahom, peno, CO2 ali z razpiženo vodo. Pri gorentju se sproščajo strupeni plini, pri gaseju v zaprtim prostoru moramo nositi dihalni aparat.

Ravnanje z ostanli sredstva in prazno embalažo:

Morebitne ostanke škropilne brozge razredimo v razmerju 1:10 in jih enakomerno porabimo na že tretirani površini. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadke skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja zlijemo v škropilno brozgo. Tako očišeno embalažo prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesemo na mesto, kjer je zbraliče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očišeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom. Sredstvo kateremu je posekel rok uporabnosti moramo oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov, kot nam narekuje zakonodaja, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki.

Številka dovoljenja za ružne primere:

INMP. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, št. "..."

z dne "..."

Navedena uporaba je v skladu z dovoljenjem za uporabo.

Splošne opombe:

Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, vendar ne jamči za izvirno zaprti embalaži. Za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega shranjevanja proizvajalec ne odgovarja.



... L